

Betafucin Cream

Composition :

Topical Antibiotic
& Anti-Inflammatory

Each gram contains :

Fusidic acid 20 mg

Betamethasone 1 mg

(As valerate)

Properties :

Betafucin cream combines the potent topical antibacterial action of fusidic acid with the anti-inflammatory and antipruritic effect of betamethasone . fusidic acid is effective in low concentrations against *staphylococci*, including strains resistant to penicillin or to other antibiotics. Topically applied fusidic acid is also effective against *streptococci*, *corynebacteria*, *neisseria* and *certain clostridia*.

Indications :

Betafucin is indicated in inflammatory dermatoses where bacterial infection is present or likely to occur. Inflammatory dermatoses include atopic eczema, discoid eczema, stasis eczema, seborrhoeic dermatitis, contact dermatitis, lichen simplex chronicus, psoriasis, discoid lumps erythematosus, insect bites, sunburns.

Dosage:

Uncovered lesions : apply 2 - 3 times daily .

Covered lesions : Less frequent application may be adequate .

Contra indications :

Topical corticosteroids are contra-indication in tuberculosis, viral and fungal skin infections .

Precautions :

Topical administration of corticosteroid to pregnant animals can cause abnormalities of foetal development . The relevance of this finding to human beings has not been established, however, topical steroids should not be used extensively during pregnancy, i.e, in large amounts or for prolonged periods.

In infants long-term continuous therapy should be avoided.

Side effects :

Hypersensitivity has rarely been encountered.

Pack : Tube of 15 gm.

The drug should not be used without medical supervision

Keep out of the reach of children



Produced by
DELTA PHARMA S.A.E
Tenth of Ramadan City A R E

بيتا فيوسين كريم

مضاد حيوى ومضاد للإلتهابات

التركيب :

كل واحد جرام يحتوى على :

حامض الفيوسيديك ٢٠ مجم

بيتا ميثازون على هيئة فاليرات ١ مجم

الخواص :

يجمع كريم بيتا فيوسين بين التأثير الموضعي القوي لحامض الفيوسيديك كمضاد حيوى وتأثير البيتاميثازون المضاد للإلتهابات والمضاد للحكة. التركزات الضئيلة من حمض الفيوسيديك فعالة ضد البكتريا العنقودية بما في ذلك سلالات البكتريا العنقودية المقاومة للبنسيلين والمضادات الحيوية الأخرى . وعندما يستخدم حمض الفيوسيديك موضعيا يكون فعال أيضا ضد البكتريا السبحية الكورينوباكتريا، الناييريا وبعض فصائل الكلوستريديا.

دواعى الإستعمال :

يوصى بإستعمال بيتا فيوسين في الحالات الآتية :

- الإلتهابات الجلدية التى يصاحبها إصابات جرثومية.
- فى الإلتهابات الجلدية التى تشمل الإكزيما السطحية ، الإكزيما القرصية والإكزيما الموضعية التى تصيب الجزء الأسفل من الساق.
- إلتهابات الجلد القشرية فى شعر الرأس والوجه.
- إلتهابات الجلد الأحتكاكية ، الحزاز الجلدى البسيط المزمن ، الصدفية ، الذئبة القرصية .
- لدغ الحشرات وحروق الشمس .

الجرعات :

تشققات الجلد المكشوفة : يدهن الكريم ٢ : ٣ مرات يوميا .

تشققات الجلد المغطاة : الإستخدام بمعدل أقل قد يكون أكثر ملائمة .

موانع الإستعمال :

مشتقات الكورتيزون الموضعية لاتستخدم فى مرضى السل الرئوى وإلتهابات الجلد الفيروسية والفطرية .

الإحتياطات :

إستخدام مشتقات الكورتيزون موضعيا على الحيوانات فى حالة الحمل يمكن أن يسبب تطورات غير طبيعية للأجنة ورغم عدم ثبوت علاقة بين هذه والإنسان إلا أنه يجب عدم الإكثار من إستخدام الكورتيزونات موضعياً للحوامل ، أى بكميات كبيرة أو لفترة طويلة .

يجب تجنب العلاج لفترة طويلة بالنسبة للأطفال .

التأثيرات الجانبية

الحساسية المفرطة نادرة الحدوث .

العبوة :

أنبوبة تحتوى على ١٥ جرام

لا يصرف ولايكرر صرفه الا بتذكرة طبية
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

إنتاج

شركة الدلتا للصناعات الدوائية ش.م.م.

مدينة العاشر من رمضان - ج.م.ع.



DELTA PHARMA