

REGNAVIT

F.C TABLETS

Composition:-

Each Tablet of Regnavit Contains:

Vitamin A (acetate)	1500 I.U.
Vitamin D3	250 I.U.
Vitamin E (acetate)	30 I.U.
Ascorbic acid	100 mg
Thiamine mononitrate	3 mg
Folic acid	1 mg
Riboflavin	3.4 mg
Pyridoxine HCL	10 mg
Nicotinamide	20 mg
Pantothenic acid	10 mg
(Calcium pantothenate)	
Cyanocobalamin (B12)	12 mcg
Biotin	30 mcg
Beta Carotene (a source of Vit.A)	1500 I.U.
Calcium (Calcium carbonate)	250 mg
Magnesium (Magnesium oxide)	50 mg
Iodine (potassium iodide)	0.15 mg
Iron (ferrous fumarate)	60 mg
Copper (cupric oxide)	2 mg
Zinc (zinc oxide)	25 mg
Chromium (chromium chloride)	25 mcg
Manganese (Manganese sulfate)	5 mg
Molybdenum (sodium molybdate)	25 mcg
Selenium (sodium selenate)	25 mcg

Indications: Regnavit is indicated in:

- vitamins & minerals deficiency during pregnancy.
- During convalescence as a general tonic.
- Postmenopausal symptoms and osteoporosis.

Precautions: pregnant and nursing mothers should contact their physician. before usage.

Important Information:

postmenopausal women. Do not take this product if taking other vitamin A supplements.

Dosage: one tablet daily with food.

Pack: boxes containing 30 tablets in 3 strips .

Storage: store at room temperature in a dry place.

**To be used under medical supervision
Keep out of reach of children**



DELTA PHARMA S.A.E

Tenth of Ramadan City , A.R.E

ريجنافيت

اقراص ذات كسوة رقيقة

التركيب :

(١٥٠٠ وحدة دولية)	فيتامين أ (أسيتات)
(٢٥٠ وحدة دولية)	فيتامين د ٣
(٣٠ وحدة دولية)	فيتامين هـ (أسيتات)
(١٠٠ مجم)	حمض اسكوربيك
(٣ مجم)	ثيامين مونونيترات
(١ مجم)	حمض الفوليك
(٣,٤ مجم)	ريبوفلافين
(١٠ مجم)	بيريدوكسين هيدروكلوريد
(٢٠ مجم)	نيكوتيناميد
(١٠ مجم)	حمض بانتوثينيك (كالسيوم بانتوثينات)
(١٢ ميكروجرام)	سيانو كوبالامين (ب٢)
(٣٠ ميكروجرام)	بيوتين
(١٥٠٠ وحدة دولية)	بيتاكاروتين (مصدر لفيتامين أ)
(٢٥٠ مجم)	كالمسيوم (كربونات الكالمسيوم)
(٥٠ مجم)	ماغنيسيوم (أكسيد الماغنسيوم)
(١٥٠ مجم)	يود (أيوديد البوتاسيوم)
(٦٠ مجم)	حديد (فيومرات الحديدوز)
(٢ مجم)	نحاس (أكسيد النحاس)
(٢٥ مجم)	زنك (أكسيد زنك)
(٢٥ ميكروجرام)	كروميوم (كروميوم كلوريد)
(٥ مجم)	منجنيز (سلفات منجنيز)
(٢٥ ميكروجرام)	موليبدينوم (صوديوم مولبيدات)
(٢٥ ميكروجرام)	سيلينيوم (صوديوم سيلينات)

دواعي الاستعمال :

يستعمل ريجنافيت في حالات :

- نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات أثناء فترة الحمل .
- كمقوي عام أثناء فترات النقاهة .
- أعراض سن اليأس وهشاشة العظام .

الإحتياجات :

يستعمل بعد إستشارة الطبيب في حالة إستعماله بالنسبة للحوامل والأمهات والمرضعات .

ملحوظة:

لا ينصح بإستخدام هذا المستحضر
متزامنا مع أي مستحضرات أخرى تحتوي على فيتامين أ .

الجرعة :

قرص واحد يوميا مع الطعام .

التعبئة:

علبة تحتوي على ٣٠ قرص في شكل شرائط .

التخزين :

يحفظ في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف .

يستعمل تحت إشراف طبي
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

شركة الدلتا للصناعات الدوائية ش.م.م

مدينة العاشر من رمضان - ج.ع .



DELTA PHARMA